

ZORGGEBRUIK TIJDENS DE CORONACRISIS

Keuzes in medicijngebruik vanuit patiëntenperspectief

In de afgelopen maanden is het leven drastisch veranderd door de uitbraak van het coronavirus. Voor veel mensen bracht het coronavirus veel vragen en onzekerheid. Het is onduidelijk of dit invloed had op hun medicatiegebruik. Dit onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in het medicatiegebruik van 2037 Nederlanders tijdens de intelligente lockdown. Deze infographic laat zien welke keuzes zij tijdens de coronacrisis maakten met betrekking tot hun gewoonlijke medicijngebruik en nieuwe medicatie.

2037 respondenten

De vragenlijst is medio mei 2020 uitgezet onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking met betrekking tot leeftijd, geslacht en provincie.


52% vrouw en 48% man

De gemiddelde leeftijd is **48 jaar** (18-89 jaar)

34% van de respondenten geeft aan binnen een risicogroep te vallen om ernstig ziek te worden

57% omschrijft de eigen gezondheid als goed of uitstekend

9% denkt dat de eigen gezondheid erg of heel erg kwetsbaar is bij een besmetting met het coronavirus



Een klein deel van de respondenten is ziek geworden door het coronavirus: **3,5%** van de respondenten heeft een positieve corona-test gehad en **1,9%** heeft een COVID-19 diagnose gehad van een arts aan de hand van symptomen, maar zonder test.



Medicijngebruik

In totaal gebruikte **44%** van de respondenten (n=899) in de afgelopen 12 maanden medicatie voor chronische aandoeningen.

De meeste gebruikte medicijnen zijn bloeddrukverlagers (35%), maagbeschermers (29%), cholesterolverlagers (29%), pijnmedicatie (23%), en medicatie voor astma of COPD (22%).

4,5% van de respondenten (n=40) heeft tijdens de coronacrisis zelf de dosis van de medicatie verhoogd of verlaagd.

Redenen om medicatie aan te passen

37% "Mijn klachten waren minder erg geworden."

22% "Ik kreeg last van bijwerkingen."

15% "Mijn klachten waren erger geworden."

15% "Ik gebruikte meer medicatie om mezelf te beschermen."

12% "Ik gebruikte minder zodat mijn medicatie minder snel op zou gaan, omdat ik niet naar de apotheek kon/wilde."

12% "Ik gebruikte minder, ik was bang dat ik door mijn medicatie kwetsbaarder zou zijn voor het coronavirus."

Respondenten die hun medicatie niet ophaalden bij de apotheek waren vaker man en jonger dan respondenten die hun medicijnen wel ophaalden.

Redenen om medicatie niet op te halen

25% "Ik was bang voor besmetting door het coronavirus."

23% "Ik heb eenzelfde soort medicijn ergens anders gekocht."

23% "Ik kwam er niet aan toe om mijn medicijnen op te halen."



(Herhaal)recepten

We vroegen aan alle respondenten (n=2037) of ze in de afgelopen 2 maanden (tijdens de intelligente lockdown) een (herhaal)recept van de huisarts hebben gekregen voor medicijnen.

In totaal kregen **892** respondenten (**44%**) een (herhaal) recept voor een medicijn. Het medicijn werd opgehaald door **96%** (n=855) van de respondenten; de overige **4%** (n=37) haalde het medicijn niet op.

Vervolg zorg

Aan de respondenten die hun recept niet ophaalden (n=37) werd gevraagd of ze alsnog zorg nodig hadden. Het merendeel (**70%**) heeft later alsnog zorg gebruiken.

Voor **35%** van de respondenten die medicatie niet heeft opgehaald was dat achteraf een slechte beslissing.

Alsnog later zorg gebruikt

24% "Ik ben later naar de spoedeisende hulp gegaan."

14% "Ik ben later nogmaals naar de huisarts gegaan."

14% "Ik heb later alsnog de voorgeschreven medicijnen opgehaald."

N.B. Het aantal respondenten dat medicatie aanpaste (n=40) of niet ophaalde (n=37) is klein, daardoor kunnen de resultaten van analyses die op deze groepen zijn uitgevoerd afwijken van de werkelijke situatie.